WIKIPEDIA

Afrika

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Afrika is die wêreld se tweede grootste kontinent (na Asië) in sowel oppervlakte as bevolking. Saam met die eilande beslaan dit ongeveer 30 221 532 km² wat 20,3% van die totale landoppervlakte van die aarde is en dit word bewoon deur meer as 1 miljard mense – ongeveer 'n sewende van die wêreldbevolking.

Afrika



Oppervlakte	30 221 532 km² (2de)
Bevolking	1,1 miljard[1] (2013, 2de)
Bevolkingsdigtheid	36,4/km²
Lande	54 (en 2 omstrede)
Afhanklike gebiede	7
Taalfamilies	Afro-Asiaties Niger-Kongo Khoisan Nilo-Saharies Austronesies Indo-Europees
Tydsones	UTC-1 (Kaap Verde) tot UTC+4 (Mauritius en Seychelle)
Grootste stede	Lagos Kaïro Kinshasa-Brazzaville Johannesburg Nairobi Mogadisjoe Khartoem-Omdoerman Dar-es-Salaam Alexandrië Abidjan Casablanca

Inhoud

Lande

Die hoofartikel vir hierdie afdeling is: Lys van Afrika-lande.




Nasa-Satellietbeeld van Afrika



Kaart van Afrika




Politiese kaart van Afrika



Die Verenigde Nasies se indeling van Afrika in substreke:[2]

- ☐ Noord-Afrika
- ☐ Wes-Afrika
- ☐ Sentraal-Afrika
- ☐ Oos-Afrika
- ☐ Suider-Afrika



Verspreiding van godsdienste in Afrika

Naam van streek en gebied, met vlag	Oppervlak (km²)	Bevolking[3]	Jaar	Bevolkingsdigtheid (per km²)	Hoofstad
Noord-Afrika					
Algerië	2 381 740	34 178 188	2009	14	Algiers
Ceuta (Spanje)	20	71 505	2001	3 575	—
Egipte	1 001 450	82 868 000	2012	83	Kaïro
Kanariese Eilande (Spanje)	7 492	2 118 519	2010	226	Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife
Libië	1 759 540	6 310 434	2009	4	Tripoli
Madeiraeilande (Portugal)	797	245 000	2001	307	Funchal
Marokko	446 550	34 859 364	2009	78	Rabat
Melilla (Spanje)	12	66 411	2001	5 534	—
Soedan	1 861 484	30 894 000	2008	17	Khartoem
Tunisië	163 610	10 486 339	2009	64	Tunis
Wes-Sahara	266 000	405 210	2009	2	Laâyoune
Horing van Afrika of **Noordoos-Afrika**					
Djiboeti	23 000	623 891	2012	22	Djiboeti
Eritrea	121 320	5 647 168	2009	47	Asmara
Ethiopië	1 127 127	84 320 987	2012	75	Addis Abeba
Somalië	637 657	9 832 017	2009	15	Mogadisjoe
Oos-Afrika					
Burundi	27 830	8 988 091	2009	323	Bujumbura


Comore-eilande	2 170	752 438	2009	347	Moroni
Kenia	582 650	39 002 772	2009	66	Nairobi
Madagaskar	587 040	20 653 556	2009	35	Antananarivo
Malawi	118 480	14 268 711	2009	120	Lilongwe
Mauritius	2 040	1 284 264	2009	630	Port Louis
Mayotte (Frankryk)	374	223 765	2009	490	Mamoudzou
Mosambiek	801 590	21 669 278	2009	27	Maputo
Réunion (Frankryk)	2 512	743 981	2002	296	Saint-Denis
Rwanda	26 338	10 473 282	2009	398	Kigali
Seychelle	455	87 476	2009	192	Victoria
Suid-Soedan	619 745	8 260 490	2008	13	Joeba
Tanzanië	945 087	44 929 002	2009	43	Dodoma
Uganda	236 040	32 369 558	2009	137	Kampala
Zambië	752 614	11 862 740	2009	16	Lusaka
Zimbabwe	390 580	11 392 629	2009	29	Harare
Sentraal-Afrika					
Angola	1 246 700	12 799 293	2009	10	Luanda
Ekwatoriaal-Guinee	28 051	633 441	2009	23	Malabo
Gaboen	267 667	1 514 993	2009	6	Libreville
Kameroen	475 440	18 879 301	2009	40	Yaoundé
Kongo	342 000	4 012 809	2009	12	Brazzaville
Demokratiese Republiek van die Kongo	2 345 410	69 575 000	2012	30	Kinshasa
São Tomé en Príncipe	1 001	212 679	2009	212	São Tomé
Sentraal-Afrikaanse Republiek	622 984	4 511 488	2009	7	Bangui
Tsjad	1 284 000	10 329 208	2009	8	N'Djamena
Suider-Afrika					
Botswana	600 370	1 990 876	2009	3	Gaborone
Lesotho	30 355	2 130 819	2009	70	Maseru
Namibië	825 418	2 108 665	2009	3	Windhoek
Suid-Afrika	1 219 912	51 770 560	2011	42	Bloemfontein, Kaapstad, Pretoria
Eswatini	17 363	1 123 913	2009	65	Mbabane
Wes-Afrika					

Benin	112 620	8 791 832	2009	78	Porto-Novo
Burkina Faso	274 200	15 746 232	2009	57	Ouagadougou
Gambië	11 300	1 782 893	2009	158	Banjul
Ghana	239 460	23 832 495	2009	100	Accra
Guinee	245 857	10 057 975	2009	41	Conakry
Guinee-Bissau	36 120	1 533 964	2009	43	Bissau
Ivoorkus	322 460	20 617 068	2009	64	Abidjan, Yamoussoukro
Kaap Verde	4 033	429 474	2009	107	Praia
Liberië	111 370	3 441 790	2009	31	Monrovia
Mali	1 240 000	12 666 987	2009	10	Bamako
Mauritanië	1 030 700	3 129 486	2009	3	Nouakchott
Niger	1 267 000	15 306 252	2009	12	Niamey
Nigerië	923 768	166 629 000	2012	180	Abuja
Senegal	196 190	13 711 597	2009	70	Dakar
Sierra Leone	71 740	6 440 053	2009	90	Freetown
Sint Helena (Verenigde Koninkryk)	420	7 728	2012	13	Jamestown
Togo	56 785	6 019 877	2009	106	Lomé
Afrika Totaal	**30 368 609**	**1 001 320 281**	**2009**	**33**	

Tale

Die hoofartikel vir hierdie afdeling is: Afrikatale.

Die meeste amptelike tale van Afrika is Indo-Europese tale soos Frans, Engels, Portugees, Spaans en Afrikaans.



Kaart van die tale van Afrika

- Frans: Benin, Burkina Faso, Burundi, Demokratiese Republiek van die Kongo, Djiboeti, Gaboen, Guinee, Ivoorkus, Kameroen, Mali, Madagaskar, Mauritanië Niger, Republiek van die Kongo, Rwanda, Senegal, Sentraal-Afrikaanse Republiek, Sierra Leone, Togo en Tsjad.
- Engels: Botswana, Gambië, Ghana, Kenia, Lesotho, Liberië, Malawi, Namibië, Nigerië, Soedan, Suid-Afrika, Suid-Soedan, eSwatini, Tanzanië, Uganda, Zambië, Zimbabwe.
- Portugees: Angola, Ekwatoriaal-Guinee, Kaap Verde en Mosambiek.
- Spaans: Ekwatoriaal-Guinee en Wes-Sahara.
- Afrikaans: Suid-Afrika (en Namibië tot 1990)
- Duits: Namibië (tot 1990)


Naas hierdie Indo-Europese tale word daar ook verskillende Afrikatale gepraat. Hulle is onderverdeel in Afro-Asiaties, Niger-Kongo, Khoisan, Nilo-Sahariese en Austronesies.

Geografie

Die hoogste punt van Afrika is Kilimandjaro, 5895 m bo seevlak en die laagste punt is die Assalmeer, 155 m onder seevlak. Die Saharawoestyn is in die noorde van Afrika terwyl die Groot Skeurvallei in Oos-Afrika is. Die grootste rivier is die Nylrivier en die grootste meer is die Victoriameer. Die grootste land volgens oppervlakte is Algerië en volgens bevolking Nigerië.

Afrika, wat 'n oppervlakte van ruim 30 miljoen km² beslaan, is na Asië en die Amerikas die derde grootste vasteland ter wêreld. Hoewel die ewenaar Afrika feitlik reëlreg in die helfte sny, dit is nou van noord na suid gesien, lê sowat twee derdes van die landmassa in die Noordelike Halfrond. Verreweg die grootste deel, meer as twee deerdes, lê tussen die Kreefskeerkring en die Steenbokskeerkring, en maak van Afrika die mees tropiese van alle vastelande.

Afrika-skild



Die Groot Skeurvallei van Oos-Afrika

Kenmerkend van Afrika is die algemene plat voorkoms van die landskap. Die grootste deel van die vasteland bestaan uit valleie en hoë plato's, met enkele heuwels en berge wat bokant die landskap uittroon. Die byna plat voorkoms van die landoppervlakte kan toegeskryf word aan die hoe ouderdom van 'n groot deel van die kontinent. Afrika bestaan uit 'n geweldig groot deel oeroue gesteentes wat in die verre verlede die diepliggende dele van die berge gevorm het. Met verloop van tyd het die berge deur verwering weggeslyt, behalwe waar daar baie harde gesteentes naby die oppervlak was, wat meer weerstand teen erosie kon bied.

Só 'n ou geologiese vorming word 'n skild genoem. Daar is talle aanduidings dat die Afrika-skild, sowel as soortgelyke geologiese skilde soos dié in Suid-Amerika, Australië, Indië en Antarktika, oorspronklik een groot vasteland, naamlik Gondwanaland, gevorm het.

Die vastelande het stadig uitmekaar gedryf tot in hul huidige posisies op die aardbol. Volgens die teorie was die eiland Madagaskar, eers deel van Afrika (Plaattektoniek).

Weens verskeie vertikale bewegings is die Afrika-skild verdeel in 'n aantal skolle of verskuiwingsblokke, elk met 'n skoffelvormige bovlak, met 'n versonke middelste vlak. In Suider-Afrika is die plato's of tafellande hoër as die verder noord. Die gemiddelde hoogte in die suidelike deel van die kontinent is sowat 1 000 meter bo seespieël, terwyl die Drakensberge, wat 'n opvallende "skottelrand" het, hoër as 3 000 m is.

Die Kongo-bekken lê sowat 300 meter bo seespieël, terwyl sy kante omtrent 1 000 meter hoog is. Noord van die bekken is die gemiddelde hoogte laer. Die diepste deel van die Sahara-bekken lê onder seespieël.

Afrika kan dus gesien word as 'n reeks plato's en valleie wat trapsgewys van suid na noord daal, met net enkele natuurlike grense tussenin.

Slenkvalleis en vulkane

In die oostelike dele van Afrika het reuse-breuk vormings, saam met vulkaniese uitbarstings, die landskap heeltemal verander. Hier is die landmassa letterlik "gebreek". So het lang en diep valleie (slenke) gevorm, wat deel vorm van 'n slenkstelsel wat van die Jordaanvallei, deur die Rooisee en Ethiopië, na die Shire-vallei in Mosambiek loop. In Oos-Afrika verdeel die slenkstelsel in twee takke waar tussen die aardkors opgedruk is.



Die Afrika-plaat

Op die plato lê die groot, maar vlak Victoriameer (skaars 80 m diep). Die westelike een van die twee groot slenkdale, naamlik die Groot Skeurvallei, kan duidelik op 'n kaart herken word omdat dit só 'n reeks smal, diep mere gevorm het van noord na suid kry 'n mens die Albertmeer, die Edwardmeer, die Kivumeer, die Tanganjikameer en die Malawimeer (Njassameer). Die oostelike lyn, wat sy beginpunt by die seestraat van Bab-el-Mandeb het, is met die eerste oogopslag nie so maklik herkenbaar nie. Die grootste meer wat hier gevorm het, is die Turkanameer, voorheen bekend as die Rudolfmeer.

Hoewel vulkaniese werkinge nog nie heeltemal uitgewoed is nie, het dit vandag nie naastenby die omvang en intensiteit wat dit voorheen gehad het nie. Daarvan getuig die groot, uitgewerkte vulkane wat tot vandag toe Afrika se hoogste berge is. Die hoogste berg is Kilimandjaro naby die grens tussen Kenia en Tanzanië. Dit is 5 895 m hoog. Hoewel dit in die middel van die tropiese gebied geleë is, is dit ewigdurend ook met sneeu bedek. Ander uitgewerkte vulkane is Berg Kenia (5 199 m) en die Elgon-gebergte (4 321 m), onderskeidelik in Kenia en op die grens tussen Kenia en Uganda. 'n Ander belangrike bewys van vulkaniese werkinge bestaan in die vorm van die lawa-afsettings wat groot oppervlaktes in Ethiopië en die hooglande van Oos-Afrika bedek.

Kameroenberg in Wes-Afrika is deur 'n soortgelyke proses gevorm, maar op 'n kleiner skaal: in dié gebied het vulkaniese werkinge 'n groter rol gespeel as breukvorming, en die opstoot van aardkorsdele na bo. Kameroenberg loop tot onder die see deur. Daarvan getuig die eilandreeks Fernando Po, Principe, Sao Tomé en Annobón.

Die vorming van bergreekse deur plooiing van die aardkors in die latere geologiese tydperke, het weinig invloed op Afrika gehad, meestal ook net aan die noordelike en suidelike rande. Hierdeur het die Atlasgebergte in die noordweste gevorm, heel waarskynlik in ongeveer dieselfde tyd as wat die groot bergreekse in Eurasië gevorm is.

Riviere en mere

Behalwe vir die Atlasgebergte met sy talle klein riviertjies, toon die waterverspreidingspatroon van Afrika 'n baie duidelike patroon wat ooreenstem met die relatief eenvoudige struktuur van die vasteland. Daar is 'n paar groot rivierbekkens, asook etlike bekkens wat nie na die see uitloop nie. Sowat een derde van Afrika se water loop nie uit na die see weens die geringe reënval. Dit geld vir die Sahara én die Kalahari én die hoogliggende droë plato's in Suid-Ethiopië en Noord-Kenia.

Die riviere in die beskutte Oos-Afrika-bekken vloei uit in die Turkanameer. Aangrensend aan die Sahara en die Kalahari lê die groot moerasagtige mere, naamlik die soet Tsjadmeer, wat waarskynlik ondergronds deur soetwaterstrome gevoed word en die Okavangomoerasse, wat weens 'n verdampingsproses soutwater bevat. Belangrike rivierbekkens is die Nylbekken, die Kongo-bekken, die stroomgebied van die Niger in Wes-Afrika, die Zambezi in die suidooste, en die Oranjerivier in Suider-Afrika.

In die algemeen is die riviere minder belangrik vir skeepvaart. Die Niger- en die Oranjerivier is byvoorbeeld in die droë seisoen te vlak vir skeepvaart. Die water van die Oranjerivier bereik selfs nie eers gedurende die hele jaar deur die see nie.




Stroomgebiede van Afrika se groot riviere

Verder het die kenmerkende platovoorkoms van Afrika tot gevolg dat die meeste riviere juis by die kus waar die platorand skielik ophou, opskiet bo 'n smal kusvlakte en watervalle of stroomversnellings tot gevolg het. Riviere vorm ook watervalle teen die kante van die plato's in die binneland waarvan talle baie indrukwekkend is.

Afrika se beroemdste waterval is die Victoria-waterval op die grens tussen Zambië en Zimbabwe waar die water van die Zambezi 100 m na benede stort. Een voordeel van dié stapsgewyse afdaling van die Afrika-rivierbeddings, is dat daar op die vasteland talle geleenthede bestaan vir hidroëlektriese kraginstallasies.

Klimaat en natuurlike plantegroei

Omdat die ewenaar deur die middel van Afrika loop, is die patroon van die klimaat en plantegroeistreke wat in die Noordelike Halfrond le, in 'n groot mate dieselfde as in die Suidelike Halfrond.




Klimaatsones in Afrika volgens die Köppen-klimaatklassifikasie

Dat dit nie heeltemal dieselfde is nie, kan toegeskryf word aan die feit dat die noordelike deel baie wyer is, en net deur diesmal Rooi See van Eurasië se landmassa geskei word, terwyl die invloed van die Indiese Oseaan tot diep in die binneland van Suider-Afrika waargeneem kan word.

Die belangrikste verskil tussen die noorde en die suide is dat die wêreld se grootste woestyn, die Sahara, in die Noordelike Halfrond is, terwyl die woestyngebiede van Suider-Afrika (die Namib en die Kalahari) baie kleiner is.

Die simmetrie van die noordelike en suidelike helftes word ook verbreek deur die hoe plato's, en dit beïnvloed ook die reënvalpatroon en temperatuur. Behalwe vir die verskille tussen die hooglande en die laerliggende dele, word die klimaat verskille van Afrika hoofsaaklik bepaal deur verskille in reënval en nie deur verskille in temperatuur nie.



Biome van Afrika

Temperatuur speel natuurlik ook 'n rol, maar (behalwe by die hoogste bergpieke) verander dit nie die algemene toestand dat Afrika regdeur die jaar warm bly. In die tropiese dele van Afrika word die seisoenverskille in reënval bepaal deur die ekwatoriale laag-drukstelsel wat 'n baie hoër reënvalsyfer tot gevolg het. In die winter (somer in die Noordelike Halfrond), beweeg die reënsone noord en in die somer van die Suidelike Halfrond (winter in die Noordelike Halfrond) beweeg dit suid. 'n Strook weerskante van die ewenaar bly regdeur die jaar onder die invloed van die reëngordel. 'n Breë sone aan weerskante van hierdie gordel ken 'n baie droë en 'n baie nat seisoen. Vir 'n gedeelte van die jaar heers daar dan 'n tropiese reënklimaat, terwyl dit die res van die jaar oorwegend droog is. Hierdie streek word dan beïnvloed deur die droë luggordels noord en suid van die vogtige ekwatoriale sone wat gedurende die loop van die jaar van noord na suid verskuif. Hoe

verder daar, van die ewenaar beweeg word, hoe langer word die droë seisoen, omdat die reënstrook sy invloed vir 'n steeds korter tyd uitoefen. Die oorgang van vogtige na droë klimaat is gewoonlik geleidelik omdat daar geen topografiese grense is wat een klimaatsones van 'n ander skei nie. Om dieselfde rede is die klimaat wisselvallig, veral in die droër seisoene.


Afrika-olifante en kwaggas in die Serengeti van Tanzanië


Die reëngordel beweeg nie volgens riglyne nie, omdat dit nie deur topografiese kenmerke gelei ward nie. Daarom is die begin van die reënseisoen moeilik voorspelbaar een jaar is dit vroeg, die volgende jaar laat. Soms val daar baie reën, dan weer minder. Die sones met wisselende droë en nat seisoene beweeg geleidelik oor na die woestyngebiede waar 'n stortbui baie selde voorkom.

In die suidelike deel van die vasteland is die woestyn relatief klein. Die Namibwoestyn, wat aan die kus van Namibië lê, is uiters droog. Die Kalahari in Botswana is in der waarheid eerder 'n halfwoestyn. Die reusagtige Sahara in die noorde word elke jaar steeds groter en brei veral na die suide uit omdat baie min reën voorkom. Dit vorm deel van 'n droëgordel wat tot diep in Asië strek.

'n Middellandse Seeklimaat, 'n klimaat wat bestaan uit droë, warm somers, en koeler winters wanneer die meeste reën voorkom, oorheers in die noordweste en die suidelike grensgebiede van Afrika. Die patroon van Afrika se plantegroei hang van die klimaatstreke af.

Tropiese reënwoude groei in die natste dele, in die hartjie van die Kongo-bekken en die kus van Wes-Afrika. 'n Ander soort reënwoud sorg vir die natuurlike plantegroei teen die nat en reënerige hellings van die Oos-Afrika-hooglande. Rondom die oerwoud, strek die vogtige savanne of grasvlakte met hoë, wuiwende gras en hoë bome. Namate die klimaat droër word, groei die gras, en selfs die bome, laer as gewoonlik. Die bome met laer kruine begin hul blare in die droë seisoen verloor. Doringbosse en Acasias is kenmerkend van die droë savanne. Hoe nader daar aan die grense van die woestyn beweeg word, hoe yler word die plantegroei. 'n Kleiner gedeelte van Afrika as wat 'n mens sou verwag – minder as 10% – is heeltemal bar. Die boomlose grasveld in die binneland van Suid-Afrika sorg vir uitstekende landboumoontlikhede.

Fauna en flora


'n Afrika-olifant en kremetart in Tanzanië

Afrika het nie so baie oerwoude soos wat die algemene indruk is nie. Die grootste deel van sy oppervlakte bestaan uit uitgestrekte vlaktes, woestyne en savannes. Gedeeltelik is dit die natuurlike gevolg van prehistoriese vulkaniese uitbarstings. Die vulkaniese afsettings is net deur 'n dun lagie grond bedek waarin bome hulle moeilik kon vasanker. Die mens het die toestand later aansienlik laat toeneem deur brande, oorbeweiding en ander bedrywighede wat erosie bevorder. Die klimaat het ook sy invloed laat geld. Die afgelope miljoen jaar het die klimaatstoestande drie keer gewissel van vogtig en nat tot droog. Só het die eens uit gebreide tropiese reënwoud al hoe kleiner geword. Aan die ander kant het die veranderinge in die klimaat die dier- en plantsoorte gedwing om hulle by die nuwe omstandighede aan te pas. Só het 'n groot verskeidenheid fauna en flora ontwikkel. Dat Afrika steeds die woonplek van die groot soogdiere is, is te danke aan die savannes en uitgestrekte grasvlaktes met verspreide boomgroepe. Ondanks die bedreiging wat die mens inhou, floreer reuse-troppe wildsbokke, sebras en buffels nog hier in die ongerepte dele van Afrika. Hul getalle word beheer deur leeus, luiperds, jagluiperds, hiënas, wildehonde, jakkalse en ander vleisvretende roofdiere. Kameelperde, renosters en Afrika-olifante is ook bewoners van die grasvlaktes, hoewel daar 'n soort olifant is wat net in die bosse bly. Die voëllewe bied 'n besondere verskeidenheid. Nêrens ter wêreld is daar so baie roofvoëls soos hier nie. Dit wissel van reuse-aasvoëls wat

op groot stukke wildaas leef tot klein dwergvalke wat net van insekte leef. Die grootste voël ter wêreld, die volstruis, wat tot 3 m lank kan word, word net in die savannes of grasvlaktes van Afrika aangetref. Onder die kenmerkende bome en struike wat wyd voorkom, is die kremetartboom (*Adansonia digitata*), ook bekend as die baobab of apebroodboom, en sekere Acacia-soorte. Die grootste woestyn in Afrika is die Sahara. Die yl plantegroei bestaan uit xerofiete of woestynplante wat hulle op een of ander manier by die droogtetoestand aangepas het. Hier kan 'n onderskeid getref word tussen grondwater en reënwaterplante. Grondwaterplante het baie lang wortels om die diep ondergrondse water maklik te kan bereik. Aalwyne kan hulle byvoorbeeld besonder goed by sulke toestande aanpas.



'n Kameelperd kom 'n swartrenoster in die Nasionale Etoshawildtuin, Namibië, teë

Reënwaterplante oorleef op hulle beurt weer deur middel van hul sade wat hul ontkiemingskrag vir jare kan behou. Wanneer dit wel reën, blom die reënplante binne 'n byna ongelooflik kort tyd.

Honderdduisende dadelpalms en ander vrugtebome word by oases aangeplant. Daarom is die plantegroei daar altyd weelderig. Die oorspronklike oaseplantegroei, wat waarskynlik uit struike soos die selonsroos (*Nerium oleander*) en bome soos die tamarinde (*Tamarindus indica*) bestaan het, het feitlik verdwyn.



'n Jagluiperd verwurg 'n rooibok in die Timbavati-natuurreservaat, Suid-Afrika

Die gebrek aan voedsel en skuiling, maak die lewe baie moeilik vir die groter soogdiere wat uit die aard van die saak 'n maklike prooi vir mensejagters is. Diere soos die jagluiperd, die hartebees, die damhert, 'n wildsboksoort, en die sierlike gemsbok, is of heeltemal uitgeroei of feitlik heeltemal uitgeroei in die woestyngebiede. Die sandheuwels van die Kalahariwoestyn is toegegroei met harde grassoorte, veral vingergras en ander soorte soetgras. In die valleie groei die sogenaamde "lewende klippe", die woestynplante, wat baie soos klippe lyk, maar hier eindig die ooreenkoms: die beskermde planthuid sorg daarvoor dat baie min vog ontsnap.

Gevolglik is die weefsel in der waarheid voedsaam en sappig.

Die Namib-woestyn in Namibië is een van die mees onherbergsame streke ter wêreld. Ook hier is die harde aapstertstreekgras (*Aristida congesta)* van die min plante wat aangetref word. Die beroemde Welwitschiaplant (*Welwitschia mirabilis*) kan ondanks die meedoënlose klimaat honderde jare aan die lewe bly.

Die tropiese reënwoude kom voor in gebiede waar die reënval meer as 1 500 mm per jaar is. Weens die vogtigheid en die baie hitte, is daar altyd 'n immergroen en baie weelderige, digte plantegroei. In Afrika word reënwoude hoofsaaklik langs die Weskus aangetref.

Ruimte vir groot troppe is daar nie en die meeste soogdiere is alleenlopers. Hulle is gewoonlik sku diere wat snags aktief is. Een van die grootste inwoners van die reënwoud is die okapi ('n skaars verwant van die kameelperd), die boseland en die reuse-bosvark.

Die sterkste aapsoort is die gorilla soos die laagland-gorilla van Nigerië, Kameroen en die Kongo, en die berg-gorilla van Uganda en die vulkaangebied van die oostelike Kongo, waar dit tot op 'n hoogte van 4 000 m voorkom.

Die ander mensaap van Afrika, die sjimpansee, kan heel gemaklik in die grasvlaktes leef, maar is in die oerwoud beter teen mense beskerm.

Die reënwoud het ook talle belangrike bruikbare plante opgelewer soos die oliepalm, en die tropiese kola- en die koffieboom.

Sien ook

- Afrika-Eurasië
- Afrika-unie
- Vlae van Afrika

Verwysings

1. Gudmastad, Ericha (2013). "2013 World Population Data Sheet" (http://www.prb.org/pdf13/2013-WPDS-infographic_MED.pdf) (PDF). *www.prb.org* (in Engels). Population Reference Bureau. Geargiveer (https://web.archive.org/web/20171020054627/http://www.prb.org/pdf13/2013-WPDS-infographic_MED.pdf) (PDF) vanaf die oorspronklike op 20 Oktober 2017. Besoek op 18 Augustus 2015.
2. "Standard Country or Area Codes for Statistical Use" (http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm) (in Engels). Millenniumindicators.un.org. Geargiveer (https://web.archive.org/web/20200424184148/https://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm) vanaf die oorspronklike op 24 April 2020. Besoek op 25 Augustus 2012.
3. (en) USCensusBureau:Countries and Areas Ranked by Population: 2009 (http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbrank.pl)[*dooie skakel*]

Bron

- *Ensiklopedie Afrikana (Edms) Bpk*, ISBN 0908409419 Stel, ISBN 0908409435 Band

Eksterne skakels

- (en) Toerisme-inligting oor Afrika (https://en.wikivoyage.org/wiki/Africa) op Wikivoyage
-
- Wikiwoordeboek het 'n inskrywing vir Afrika.
- (en) "Africa" (https://www.britannica.com/place/Africa). Encyclopædia Britannica. Besoek op 26 Mei 2018.
- (en) allAfrica.com (http://allafrica.com/) – onlangse nuus, gebeure en statistieke

Wikimedia Commons bevat media in verband met ***Afrika***.

Kontinente van die wêreld


Afrika-Eurasië


Amerikas


Eurasië


Oseanië

						
Afrika	Antarktika	Asië	Australië	Europa	Noord-Amerika	Suid-Amerika

Geologiese superkontinente : Gondwana · Laurasië · Pangaea · Rodinia · Ur · Vaalbara

v · t · e (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Sjabloon:Gebiede_van_die_Wêreld&action=edit)

Gebiede van die Wêreld

Afrika	Sentraal-Afrika · Oos-Afrika · Groot Mere · Guinee · Horing van Afrika · Noord-Afrika · Magreb · Noordwes-Afrika · Sahara · Sahel · Suider-Afrika · Afrika suid van die Sahara · Soedan · Wes-Afrika
Amerikas	Andes-state · Karibiese Eilande · Sentraal-Amerika · Groot Mere · Groot Vlaktes · Guianas · Latyns-Amerika · **Noord-Amerika** · Patagonië · **Suid-Amerika** · Suidelike Keël ·
Eurasië	Anatolië · Arabië · **Asië** · Balkan · Baltiese lande · Benelux · Britse Eilande · Indiese subkontinent · Kaukasus · Sentraal-Asië · Sentraal-Europa · Oos-Asië · Oos-Europa · **Europa** · Verre-Ooste · Levant · Mediterreense gebied · Midde-Ooste · Noord-Asië · Noord-Europa · Na-Sowjetse lande · Skandinawië · Suidoos-Asië · Suid-Europa · Wes-Asië · Wes-Europa
Oseanië	Australasië · Melanesië · Mikronesië · Polinesië · Stille Oseaanrand
Poolgebiede	Noordpoolgebied · Antarktika

v · t · e (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Sjabloon:Lande_en_gebiede_van_Afrika&action=edit)

Lande en gebiede in Afrika

Lande	Algerië • Angola • Benin • Botswana • Burkina Faso • Burundi • Comore-eilande • Demokratiese Republiek van die Kongo • Djiboeti • Egipte[1] • Ekwatoriaal-Guinee • Eritrea • Eswatini • Ethiopië • Gaboen • Gambië • Ghana • Guinee • Guinee-Bissau • Ivoorkus • Kaap Verde • Kameroen • Kenia • Lesotho • Liberië • Libië • Madagaskar • Malawi • Mali • Marokko • Mauritanië • Mauritius • Mosambiek • Namibië • Niger • Nigerië • Republiek van die Kongo • Rwanda • São Tomé en Príncipe • Senegal • Sentraal-Afrikaanse Republiek • Seychelle • Sierra Leone • Soedan • Somalië • Suid-Afrika • Suid-Soedan • Tanzanië • Togo • Tsjad • Tunisië • Uganda • Zambië • Zimbabwe	
Omstrede gebiede	(Cabinda • Galmudug • Puntland) • Somaliland • Wes-Sahara	
Afhanklike gebiede	**Frankryk**: Mayotte • Réunion **Portugal**: Madeiraeilande **Spanje**: Kanariese Eilande • Ceuta • Melilla **Verenigde Koninkryk**: Sint Helena, Ascension en Tristan da Cunha	
Lande van	Asië • Europa • Noord-Amerika • Oseanië • Suid-Amerika	

1. Land deels in Asië.

Normdata BNF: cb153236036 (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb153236036) (data) (https://data.bnf.f

r/ark:/12148/cb153236036) · GND: 4000695-5 (https://d-nb.info/gnd/4000695-5) · LCCN: sh85001531 (https://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85001531) · NARA: 10044605 (https://catalog.archives.gov/id/10044605) · NDL: 00560082 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00560082) · NKC: ge137148 (https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=ge137148&CON_LNG=ENG) · SELIBR: 138939 (https://libris.kb.se/auth/138939) · VIAF: 123310773 (https://viaf.org/viaf/123310773) · WorldCat Identities (via VIAF): 123310773 (https://www.worldcat.org/identities/containsVIAFID/123310773)